

VITARAN I - II

VITARAN I er beregnet for bruk på under øyet (periorbitalområdet) og VITARAN II er

beregnet for bruk på ansikt, hender, hals og dekolletage. **Kontraindikasjoner**

Intradermale injeksjoner anbefales ikke under graviditet og amming, forkjølelse, bruk av antibiotika og antikoagulantia. Kontraindikasjoner for mesoterapi inkluderer også onkologi, lav blodpropp, epilepsi og individuell intoleranse mot stoffet.

VITARAN I

Vitaran I administreres gjennom intradermale injeksjoner, med en anbefalt dosering på: 0,5 ml per øye for periokulære rynker.

Injiseres til en dybde på 2-3 mm, i området rundt øynene - 1-2 mm ved bruk av mesoterapeutiske og lineær-retrograde teknikker. Det forebyggende kurset består av 2-4 prosedyrer, som foreskrives med 3-4 ukers mellomrom. En serie injeksjoner gjentas 2 ganger i året.

Mesoterapi for rask vevsrestaurering etter operasjon (inkludert blefaroplastikk) utføres 2 uker etter operasjon. Cocktailinjeksjoner anbefales også for pasienter en uke før og 2 uker etter aggressive kosmetiske prosedyrer.

VITARAN II

Vitaran II 2 ml per behandling for hele ansiktet. 2-4ml per økt for nakke og dekolletage. 1 ml per hånd.

Teknikker og protokoller

1. 5 poeng teknikk (10 poeng, "løftepunkter")

- Injiser 0,1 ml til 0,2 ml per punkt subdermalt ("standard" behandling), 10 poeng = 1,4 ml bruk de siste 0,1 ml for å jevne ut eller legg til mer på den ene siden, om nødvendig. (10 poeng, "Løfting poeng")
- Fordel som følger: På toppen av kinnbeina og kjevelinjen: injiser 0,2 ml per punkt og resten 0,1 ml per punkt. Slik at det er 0,7ml per side.
- *Hvis kunden ønsker mer volum kan du øke doseringen iht trenger og sett f.eks 1,5 ml-3ml per side.

Kanyle

- Injiser 0,2 ml til 0,4 ml per linje i «viften», subdermalt. Som man ville satt vanlig filler med kanyle.
- Her bruker du vanligvis 1,5 ml fordelt på begge sider, men kan øke produktet volum basert på hva kunden ønsker og behov.

